

Задача 1. Исследовать СЛУ на совместность $\begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 4 \\ 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 18 \end{cases}$ и решить ее:

1) по формулам Крамера;

2) с помощью обратной матрицы, проверить является ли найденная матрица обратной.

Решение

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 2 & 5 & -3 \\ 5 & 6 & -2 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 4 \cdot 8 + 3 \cdot 11 + 2 \cdot (-13) = 39 \neq 0 \Rightarrow \text{система совместна и имеет}$$

единственное решение.

1)

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 9 & -3 & 2 \\ 4 & 5 & -3 \\ 18 & 6 & -2 \end{vmatrix} = 9 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 18 & -2 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 18 & 6 \end{vmatrix} = 9 \cdot 8 + 3 \cdot 46 + 2 \cdot (-66) = 78$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 5 & 18 & -2 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 18 & -2 \end{vmatrix} - 9 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 18 \end{vmatrix} = 4 \cdot 46 + 9 \cdot 11 + 2 \cdot 16 = 117$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 9 \\ 2 & 5 & 4 \\ 5 & 6 & 18 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 18 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 18 \end{vmatrix} + 9 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 4 \cdot 66 + 3 \cdot 16 + 9 \cdot (-13) = 195$$

По формулам Крамера: $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$, $i = \overline{1,3} \Rightarrow x_1 = 2; x_2 = 3; x_3 = 5$.

2)

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = 8 \quad A_{21} = - \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = 6 \quad A_{31} = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -11 \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -18 \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 16$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -13 \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -39 \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 26.$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{39} \cdot \begin{bmatrix} 8 \cdot 9 + 6 \cdot 4 - 1 \cdot 18 \\ -11 \cdot 9 - 18 \cdot 4 + 16 \cdot 18 \\ -13 \cdot 9 - 39 \cdot 4 + 26 \cdot 18 \end{bmatrix} = \frac{1}{39} \cdot \begin{bmatrix} 78 \\ 117 \\ 195 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 2 & 5 & -3 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix} \cdot \left(\frac{1}{39} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 6 & -1 \\ -11 & -18 & 16 \\ -13 & -39 & 26 \end{bmatrix} \right) =$$

$$= \frac{1}{39} \cdot \begin{bmatrix} 4 \cdot 8 - 3 \cdot (-11) + 2 \cdot (-13) & 4 \cdot 6 - 3 \cdot (-18) + 2 \cdot (-39) & 4 \cdot (-1) - 3 \cdot 16 + 2 \cdot 26 \\ 2 \cdot 8 + 5 \cdot (-11) - 3 \cdot (-13) & 2 \cdot 6 + 5 \cdot (-18) - 3 \cdot (-39) & 2 \cdot (-1) + 5 \cdot 16 - 3 \cdot 26 \\ 5 \cdot 8 + 6 \cdot (-11) - 2 \cdot (-13) & 5 \cdot 6 + 6 \cdot (-18) - 2 \cdot (-39) & 5 \cdot (-1) + 6 \cdot 16 - 2 \cdot 26 \end{bmatrix} = \frac{1}{39} \begin{bmatrix} 39 & 0 & 0 \\ 0 & 39 & 0 \\ 0 & 0 & 39 \end{bmatrix} = E$$

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{39} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 6 & -1 \\ -11 & -18 & 16 \\ -13 & -39 & 26 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 2 & 5 & -3 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{39} \cdot \begin{bmatrix} 8 \cdot 4 + 6 \cdot 2 - 1 \cdot 5 & 8 \cdot (-3) + 6 \cdot 5 - 1 \cdot 6 & 8 \cdot 2 + 6 \cdot (-3) - 1 \cdot (-2) \\ -11 \cdot 4 - 18 \cdot 2 + 16 \cdot 5 & -11 \cdot (-3) - 18 \cdot 5 + 16 \cdot 6 & -11 \cdot 2 - 18 \cdot (-3) + 16 \cdot (-2) \\ -13 \cdot 4 - 39 \cdot 2 + 26 \cdot 5 & -13 \cdot (-3) - 39 \cdot 5 + 26 \cdot 6 & -13 \cdot 2 - 39 \cdot (-3) + 26 \cdot (-2) \end{bmatrix} = \frac{1}{39} \begin{bmatrix} 39 & 0 & 0 \\ 0 & 39 & 0 \\ 0 & 0 & 39 \end{bmatrix} = E$$

Задача 2. $A_1(1;3;6); A_2(2;2;1); A_3(-1;0;1); A_4(-4;6;-3)$

1) найти угол между векторами $\overrightarrow{A_1A_2}$ и $\overrightarrow{A_1A_4}$;

2) площадь грани $A_1A_2A_3$;

3) объем пирамиды;

4) уравнение плоскости $A_1A_2A_3$.

Решение

$$1) \overrightarrow{A_1A_2} = (2-1; 2-3; 1-6) = (1; -1; 5); \quad \overrightarrow{A_1A_4} = (-4-1; 6-3; -3-6) = (-5; 3; -9);$$

$$|\overrightarrow{A_1A_2}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-5)^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}; \quad |\overrightarrow{A_1A_4}| = \sqrt{(-5)^2 + 3^2 + (-9)^2} = \sqrt{115};$$

$$\cos(\angle \overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_4}) = \frac{(\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_4})}{|\overrightarrow{A_1A_2}| \cdot |\overrightarrow{A_1A_4}|} = \frac{1 \cdot (-5) - 1 \cdot 3 - 5 \cdot (-9)}{3\sqrt{3} \cdot \sqrt{115}} = \frac{37}{3\sqrt{345}} \Rightarrow \angle \overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_4} =$$

$$= \arccos\left(\frac{37}{3\sqrt{345}}\right) \approx 48^\circ 24'$$

$$2) \overrightarrow{A_1A_3} = (-1-1; 0-3; 1-6) = (-2; -3; -5). \quad S_{\Delta A_1A_2A_3} = \frac{1}{2} \text{mod}[\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}]$$

$$[\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & -1 & -5 \\ -2 & -3 & -5 \end{vmatrix} = \bar{i} \cdot \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} - \bar{j} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} + \bar{k} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -10 \cdot \bar{i} + 15 \cdot \bar{j} - 5 \cdot \bar{k} \Rightarrow$$

$$S_{\Delta A_1A_2A_3} = \frac{1}{2} \sqrt{(-10)^2 + 15^2 + (-5)^2} = \frac{5}{2} \sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2} = \frac{5\sqrt{14}}{2} \text{ (кв.ед.)}$$

3)

$$(\overrightarrow{A_1A_4}, \overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}) = \begin{vmatrix} -5 & 3 & -9 \\ 1 & -1 & -5 \\ -2 & -3 & -5 \end{vmatrix} = -5 \cdot (-10) - 3 \cdot (-15) - 9 \cdot (-5) = 140$$

$$V_{\Delta A_1A_2A_3A_4} = \frac{1}{6} \text{mod}(\overrightarrow{A_1A_4}, \overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}) = \frac{70}{3} \text{ (куб.ед.)}$$

4) Уравнение плоскости $A_1A_2A_3$ запишем по точке A_1 и двум неколлинеарным векторам $\overrightarrow{A_1A_2}$ и $\overrightarrow{A_1A_3}$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-6 \\ 1 & -1 & -5 \\ -2 & -3 & -5 \end{vmatrix} = 0$$

$$-10 \cdot (x-1) + 15 \cdot (y-3) - 5 \cdot (z-6) = 0; \quad 2 \cdot (x-1) - 3 \cdot (y-3) + z - 6 = 0; \quad 2 \cdot x - 3 \cdot y + z + 1 = 0.$$

Задача 3. Вычислить пределы:

Решение

1а)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 2x^2 + 3x + 5}{4x^3 - x + 2} = \left| \frac{\infty}{\infty} \right| = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{4 - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}} = \frac{1+0+0+0}{4-0+0} = 0.25$$

1б)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 2x} = \left| \frac{\infty}{\infty} \right| = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)}{x} = \frac{2+2}{2} = 2$$

1в)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2} = \left| \frac{0}{0} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{3x}{2}}{x^2} = \frac{9}{2} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{3x}{2}}{\frac{3x}{2}} \right)^2 = 4,5 \cdot 1^2 = 4,5$$

P.S. Воспользовались первым замечательным пределом.

2)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{2x+1} \right)^{3x-4} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(2x+1)-4}{2x+1} \right)^{3x-4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{4}{2x+1} \right)^{3x-4} = |1^\infty| = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{\frac{2x+1}{-4}} \right)^{\frac{2x+1}{-4}} \right)^{\frac{4(3x-4)}{2x+1}} = \\ &= e^{-4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-4}{2x+1}} = e^{-4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-\frac{4}{x}}{2+\frac{1}{x}}} = e^{-4 \cdot \frac{3-0}{2+0}} = e^{-6} \end{aligned}$$

P.S. Был использован второй замечательный предел.

Задача 4. Исследовать функцию $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, x \leq 1; \\ 2x, 1 < x \leq 3; \\ x + 2, x > 3. \end{cases}$ на непрерывность, указать вид точек разрыва.

Решение

Функции $f_1(x) = x^2 + 1$, $f_2(x) = 2x$ и $f_3(x) = x + 2$ непрерывны при $x \in R \Rightarrow f(x)$ может терпеть разрыв лишь в точках $x_1 = 1$ и $x_2 = 3$, где меняется аналитическое задание функции

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} (x^2 + 1) = 1^2 + 1 = 2 = f(1); \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} (2x) = 2 \cdot 1 = 2 = 2.$$

Так как $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = f(1) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) \Rightarrow x = 1$ - точка


непрерывности.

$$\lim_{x \rightarrow 3-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-0} (2x) = 2 \cdot 3 = 6 = f(3);$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+0} (x + 2) = 5.$$

Так как $\lim_{x \rightarrow 3-0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3+0} f(x)$, но односторонние пределы

конечны, то $x = 3$ точка разрыва первого рода (точка конечного скачка) $\Rightarrow f(x)$ непрерывна при $x \in R \setminus \{3\}$.



Задача 5. Найти производные заданных функций.

Решение

1а)

$$\begin{aligned} y' &= (\sin^2 2x)' - (\sqrt{x+1} \cdot \ln 5x)' = 2 \sin 2x \cdot (\sin 2x)' - ((\sqrt{x+1})' \cdot \ln 5x + \sqrt{x+1} \cdot (\ln 5x)') = \\ &= 2 \sin 2x \cdot \cos 2x \cdot (2x)' - \left(\frac{1}{2\sqrt{x+1}} \ln 5x + \sqrt{x+1} \cdot \frac{1}{5x} \cdot (5x)' \right) = 2 \sin 4x - \frac{\ln 5x}{2\sqrt{x+1}} - \frac{\sqrt{x+1}}{x} \end{aligned}$$

1б)

$$\ln y = \operatorname{tg} x \ln(x-1) \Rightarrow \frac{y'}{y} = (\operatorname{tg} x)' \ln(x-1) + \operatorname{tg} x \cdot (\ln(x-1))' \Rightarrow y' = y \left(\frac{1}{\cos^2 x} \ln(x-1) + \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{x-1} \right) \Rightarrow$$

$$y' = (x-1)^{\operatorname{tg} x} \left(\frac{\ln(x-1)}{\cos^2 x} + \frac{\operatorname{tg} x}{x-1} \right)$$

1в)

$x + y = \sin xy$. Дифференцируем уравнение, считая $y = f(x)$

$$1 + y' = \cos xy \cdot (xy)' \Rightarrow 1 + y' = \cos xy (1 \cdot y + x \cdot y') \Rightarrow y' - y' \cdot x \cos xy = y \cos xy - 1 \Rightarrow y' = \frac{y \cos xy - 1}{1 - x \cos xy}$$

$$2) \begin{cases} x = t + \ln t \\ y = t - \ln t \end{cases}$$

$$x'_t = 1 + \frac{1}{t}; \quad y'_t = 1 - \frac{1}{t}; \quad \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\frac{t-1}{t}}{\frac{t+1}{t}} = \frac{t-1}{t+1};$$

Так как $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$, то $\begin{cases} y'_x = \frac{t-1}{t+1} \\ x = t + \ln t \end{cases}$

